

! Μην αγνοήσεις τα σημάδια.

Εάν ένα νεογέννητο μωρό έχει:

- Ίκτερο που επιμένει για περισσότερο από δύο εβδομάδες
- Ανοιχτόχρωμα κόπρανα
- Σκούρα ή έντονα κίτρινα ούρα

Θα πρέπει να συμβουλευτείτε άμεσα τον παιδίατρό σας, καθώς τα συμπτώματα αυτά μπορεί να αποτελούν σημάδια ηπατικής νόσου, όπως η ατρησία των χοληφόρων.



**Paediatric Liver
GI Nutrition Centre**
Arch. Makarios III, King's College Hospital

Τηλ.: +357 22 405 368 | Φαξ: +357 22 496 263
Email: pedlivergastro.nam3@shso.org.cy

Το Παιδιατρικό Κέντρο Ήπατος, Γαστρεντερολογίας και Διατροφής του Μακάριου Νοσοκομείου προσφέρει εξειδικευμένη διάγνωση, παρακολούθηση και φροντίδα σε παιδιά με παθήσεις του ήπατος και του γαστρεντερολογικού συστήματος.



Αρ. Μητρώου: 3901

Ο Σύνδεσμός μας στηρίζει τα παιδιά με ηπατικές παθήσεις και τις οικογένειές τους, συμβάλλοντας στην ενημέρωση, την ευαισθητοποίηση και την καλύτερη κατανόηση των παιδιατρικών ηπατικών παθήσεων.

Μέσα από τη δράση μας επιδιώκουμε η σωστή ενημέρωση να φτάνει έγκαιρα στους γονείς και στους επαγγελματίες υγείας.



Μάθετε περισσότερα
για την Ατρησία Χοληφόρων

Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο: 99 567 664 & 22 203 762

Email: liverdiseasefoundation@gmail.com

Διεύθυνση: Οδός Ακροπόλεως 71, ΤΚ 2012,
Στρόβολος, Λευκωσία

Ακολουθήστε μας, στα μέσα κοινωνικής
μας δικτύωσης!

f Παιδιά με Ηπατικές Παθήσεις - Γιώργος
Ψαράς Round Table

ig [paidia_me_ipatikes_pathisis](https://www.instagram.com/paidia_me_ipatikes_pathisis)

www.childrenliverdisease.com

Ατρησία Χοληφόρων



**Η έγκαιρη διάγνωση
είναι ζωτικής σημασίας!**

**Οι ηπατικές παθήσεις μπορεί να
εμφανιστούν και σε νεογνά και
μικρά παιδιά.**



Ενημέρωση • Στήριξη • Ελπίδα

Τι είναι η Ατρησία Χοληφόρων;

Η ατρησία των χοληφόρων είναι μια σπάνια και σοβαρή πάθηση του ήπατος.

Οι χοληφόροι πόροι –τα «σωληνάκια» που μεταφέρουν τη χολή από το ήπαρ προς το έντερο– είναι κλειστοί, κατεστραμμένοι ή δεν έχουν αναπτυχθεί φυσιολογικά.



Έτσι, η χολή δεν μπορεί να αποχετευθεί σωστά και συσσωρεύεται στο ήπαρ, προκαλώντας σταδιακά φλεγμονή, ανάπτυξη ουλών (ίνωση) και τελικά κίρρωση εάν δεν αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Η αρχική θεραπεία είναι η επέμβαση Κασάι, κατά την οποία δημιουργείται μια δίοδος ώστε η χολή να αποχετεύεται από το ήπαρ προς το έντερο. Η αποτελεσματικότητα της επέμβασης μειώνεται όσο καθυστερούν η διάγνωση και η θεραπεία.

Καθυστέρηση στη Διάγνωση

Η διάγνωση της ατρησίας των χοληφόρων συχνά καθυστερεί, καθώς τα σημάδια της νόσου μπορεί να είναι δύσκολο να αναγνωριστούν.

Η καθυστέρηση στη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρές επιπλοκές, όπως κίρρωση και ανάγκη για μεταμόσχευση ήπατος, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής και, σε σοβαρές περιπτώσεις, θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή του παιδιού.

Για την αποφυγή αυτών των επιπλοκών και τη διασφάλιση της καλύτερης δυνατής πρόγνωσης, είναι ζωτικής σημασίας η διάγνωση να γίνεται όσο το δυνατόν νωρίτερα, με την έγκαιρη αναγνώριση των αρχικών σημείων της νόσου.

Ποια σημάδια πρέπει να προσέξετε;

Επίμονος Ίκτερος

Ο ίκτερος εμφανίζεται όταν το δέρμα ενός μωρού και το λευκό των ματιών του γίνονται κίτρινα.

Ο ίκτερος που παραμένει


- πέρα από τις 2 εβδομάδες σε τελειόμηνα βρέφη ή
- πέρα από 3 εβδομάδες σε πρόωρα βρέφη ή θηλάζοντα βρέφη

Θα μπορούσε να είναι σημάδι παιδικής ηπατικής νόσου ή και ατρησίας χοληφόρων.

Σκούρα ούρα

Τα ούρα ενός μωρού είναι συνήθως πολύ ανοιχτόχρωμα.

Επίμονα κίτρινα ή σκούρα ούρα, ιδιαίτερα όταν χρωματίζουν έντονα την πάνα, μπορεί να αποτελούν σημαντικό προειδοποιητικό σημάδι.



Ανοιχτόχρωμα κόπρανα

Τα φυσιολογικά κόπρανα ενός βρέφους μπορεί να έχουν διάφορες αποχρώσεις του κίτρινου, του καφέ ή του πράσινου.

Ωστόσο, επίμονα πολύ ανοιχτόχρωμα, γκριζωπά ή σχεδόν λευκά κόπρανα μπορεί να αποτελούν σημάδι ηπατικής νόσου, όπως η ατρησία των χοληφόρων.



ΒΡΕΦΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΡΗΣΙΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ

Μη Φυσιολογικό Χρώμα Κοπράνων		
#1	#2	#3
#4	#5	#6
Φυσιολογικό Χρώμα Κοπράνων		
#7	#8	#9

ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΟΠΩΣ ΕΛΕΓΧΕΤΕ ΤΟ ΧΡΩΜΑ ΤΩΝ ΚΟΠΡΑΝΩΝ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΑ ΜΕΤΑ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΑΤΡΗΣΙΑΣ ΧΟΛΗΦΟΡΩΝ.

Ενημερώστε άμεσα το γιατρό σας αν παρατηρήσετε ότι το βρέφος σας έχει μη φυσιολογικό χρώμα κοπράνων όπως πιο πάνω #1, 2, 3, 4, 5, 6.